

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'UNIVERSITE DE PARIS

Directeur: Ch. Maurain

Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. $2^{\circ}29'37''$ E. Gr. Lat. $48^{\circ}48'34''$ N. Alt. 47m.


Appareil: Séismographe Wiechert masse 1000 Kilogrs.

Cte N. $T_0=11^s5; \varepsilon=4,2; V=221$. Cte E. $T_0=11^s6; \varepsilon=4,0; V=231$

Bulletin séismique du 1er au 31 Janvier 1935

par C. L. Brazier et L. Genaux.

Dates	Phases	T. H. Gr.	T_N	T_E	A_N	A_E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
1er	iP	13 40 10					dilatation
	e	57					
	L	14 12					
	M ₁	22-23		19		9	
	M ₂	40-41	19		7		
	F	16,1					
2	eL	23 23					
	M	29-30		14		3	
	F	55					
3	iP	2 0 49					$\Delta=(7280\text{Km.})$
	e(S) N	9 32					Thibet.
	L	14					
	M ₁	27-28	22		28		
	M ₂	31-32	14	19	15	21	
	M ₃	32-33		21		20	
	F	3 37					
4	traces	10h52 à 11h4m					V. Galitzine.
4	iP	14 45 55					$\Delta=2230\text{Km.}$ dilatation
	iS	49 38					Mer de Marmara
	L	52					Cte E-W=+
	M ₁	52-53	13	13	100	50	
	M ₂	53-54	14	14	60	70	
	M ₃	56	10	11	70	60	
	F	d ^s le suiv ^t					
4	iP	16 24 33					$\Delta=2210\text{Km.}$ dilatation
	iS	28 14					Mer de Marmara
	L	30					Cte E-W=+
	M ₁	31-32	11	13	80	50	
	M ₂	32-33	12	12	70	50	
	F	18 18					
4	traces	20 8-43					V. Galitzine.
11	eL	1 0					id.
	F	32					
14	traces	3 5-38					V. Galitzine.
17	iP	2 28 3					
	L	3 20					
	M ₁	28-29	30		10		
	M ₂	29-30	26		9		
	M ₃	31-32		25		7	
	F	4 53					



Janvier 1935 8/									
Dates.	Phases.	T.	M?	Gr.	T _N	T _L	A _N	A _E	Remarques
		h	m	s	s	s	μ	μ	
17	traces	9	3-28						V. Galitzine
18	eL	2	24						id.
	F	3	7						
18	e L	12	31						id. faible
	F	13	8						
18	eL	18	3						
	M		12-13		17	18	9	12	
	F		39						
18	traces	21	29-43						V. Galitzine.
19	id	1	5-13						id.
19	eL	11	54						
	F	d ^s	1e suiv ^t						
19	iP	12	47 3						Δ=6100Km?
	eS		54 (43)						
	L	13	3						
	H ₁		6- 7			22		7	
	M ₂		12-13		14	12	3	3	
	F	14	32						
22	traces	11	16-34						V. Galitzine
22	eL	16	3						
	F	17	12						
23	eP	7	36 7						Δ=8950Km.
	eS		46 15						
	L		51						
	H ₁	8	13		21	17	48	29	
	M ₂		18-19		18	17	50	31	
	M ₃		20-21		21		44		
	M ₄		25-26			19		34	
	F	11	29						
30	eL	1	0						
	M		11-12			13		2	
	F	2	11						
31	eL	10	30						
	F	11	9						
31	eL	19	7						
	F	20,1							

A dater du 1er Janvier 1935, et pour satisfaire au désir exprimé par MrMishio Ishimoto, directeur de l'Institut des recherches séismiques à l'Université Impériale de Tokio, nous indiquerons dans la colonne "Remarques" en regard du séisme intéressé et chaque fois que la netteté des phases P sera suffisante, le sens du mouvement vrai du sol pour chaque composante, le signe + désignant un mouvement vers l'Est ou le Nord et le signe - un mouvement vers l'Ouest ou le Sud.

JOURNAL SEISMOLOGIQUE.

1er: 1 toute la journée; 2: 1 jusqu'à 7h, 2 de 7h à 23h 1 ensuite; 3: 1 jusqu'à 5h, 2 de 5h à 8h, 1 ensuite; 4-9: 1 toute la journée; 10: 1 jusqu'à 6h, 2 de 6h à 18h, 1 ensuite.

11: 1 jusqu'à 6h, 2 ensuite. 12: 2 jusqu'à 2h, 1 de 2h à 7h, 2 ensuite; 13: 1 jusqu'à 18h, 2 de 18h à 22h, 1 ensuite; 14-20 1 toute la journée.

21-22: 1 toute la journée; 23: 1 jusqu'à 10h, 2 ensuite 24: 1 jusqu'à 5h, 2 de 5h à 10h, 1 ensuite; 25: 1 jusqu'à 4h, 2 de 4h à 7h, 3 ensuite; 26: 3 jusqu'à 20h, 2 ensuite; 27: 2 jusqu'à 7h 1 ensuite; 28-30: 1 toute la journée; 31: 1 jusqu'à 8h, 2 ensuite.

Caractéristique moyenne du mois: 1,26

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. $2^{\circ}29'37''$ E Gr. Lat. $48^{\circ}48'34''$ N. Alt. 47m.

Appareil: Séismographe Wiechert masse 1000 Kilogrs.

Cte. N: $T=11,5$; $\xi=4,1$; $V=219$. Cte. E: $T=11,5$; $\xi=4,0$; $V=231$

Bulletin séismique du 1er au 28 Février 1935
par C.E. Brazier et L. Genaux.

Dates	phases	T. M. Gr.	T_N	T_E	A_N	A_E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
3	eL	3 21					
	M	45-46		15		3	
	F	3,8					
4	eL	18 44					
	F	19 56					
6	i	2 1 18					
	L	12					
	F	48					
7	eL	18 21					
	F	19 9					
9	e	19 55?					
	L	20 8					
	M	16-17	13	13	4	4	
	F	21 6					
13	eL	9 54					
	F	10 39					
13	traces	17h40 à 18h54					V. Galitzine
17	eL	17 10					
	F	22					
18	eL	6 49					
	F	7 4					
19	traces	21 1-22					V. Galitzine
22	e(P)	17 19 22?					$\Delta = (7390 \text{ Km.})$
	e(S)	28 (11)					débuts douteux
	L	39					très forte agitation
	M ₁	39-40		22		44	du 21 au 28.
	M ₂	55-56		28		66	
	M ₃	57-58	19	18	36	43	
	M ₄	18 2-3	18		39		
	M ₅	5-8	16	14	30	33	
	F	20,5					
25	iP	2 56 5					$\Delta = 2220 \text{ Km.}$ dil ^{on}
	iS	59 48	7	7	60	40	Cte. E + Destructeur
	L	3 2					dans l'Ile de Crète.
	M ₁	3-4	9	9	26	22	
	M ₂	4-5	7	9	47	23	
	F	3,5					

Journal Séismologique.

1er-2: 2 toute la journée; 3: 2 jusqu'à 20h, 1 ensuite; 4: 1 jusqu'à 15h, 2 de 15h à 21h, 1 ensuite; 5-8: 1 toute la journée; 9: 1 jusqu'à 5h, 2 de 5h à 19h, 1 ensuite; 10-13: 1 toute la journée; 14: 1 jusqu'à 16h, 2 de 16h à 19h, 1 ensuite; 15: 1 jusqu'à 5h, 2 de 5h à 20h, 1 ensuite; 16: 1 jusqu'à 6h, 2 de 6h à 20h, 1 ensuite; 17-19: 1 toute la journée; 20: 1 jusqu'à 10h, 2 de 10h à 19h, 3 de 19h à 21h, 2 ensuite.

21: 2 jusqu'à 6h, 3 ensuite; 22-25: 3 toute la journée; 26: 3 jusqu'à 6h, 2 de 6h à 15h, 3 de 15h à 21h, 2 ensuite; 27: 2 jusqu'à 6h, 3 ensuite; 28: 2 jusqu'à 3h, 3 de 3h à 19h, 2 ensuite.

Caractéristique moyenne du mois: 1,75.

Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR
 Long. 2°29'37"E. Gr. Lat. 48°48'34"N. Alt. 47 mètres

Appareil: Séismographe Wiechert masse 1000 Kgrs

Cte N: $T_0=11.5$; $\xi=4.2$; $V=216$. Cte E: $T_0=11.6$; $\xi=3.9$; $V=230$

Bulletin séismique du 1er au 31 Mars 1935
 par C.E. Brazier et L. Genaux

Dates.	Phases.	T. H. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques
		$\frac{h}{m} - \frac{s}{s}$	$\frac{s}{s}$	$\frac{s}{s}$	$\frac{\mu}{\mu}$	$\frac{\mu}{\mu}$	
2	traces	6 30-41					V. Galitzine
5	e	10 (35)					
	L	46					
	M ₁	51-52	22		11		
	M ₂	54	25	22	10	10	
	F	11 43					
5	eP	22 36 (3)					int. min.
	L	50					
	M	55-56	13	13	2	5	
	F	23 42					
7	eL	1 38					V. Galitzine
	F	2, 6					
7	eL	11 20					
	F	38					
11	eL	12 19					
	M	21-22	14	13	4	4	
	F	46					
12	eL	14 8					
	M	13-14	16		6		
	F	37					
13	eL	19 46					faible. V. Gal
	F	20 37					
14	iP	12 23 31					V. Galitzine
	L	13 15					
	F	14 23					id.
14	eL	14 59					
	F	15 39					
14	e	15 52 27					
	L	16 51					
	M ₁	17 2-3	16		2		
	M ₂	6-7		19		4	
	F	18 6					
14	e(P)	17 7 (35)					phases confondues dans les L du pré- cédent.
	L	9					
	M	11	6	8	4	4	
	F	17					V. Galitzine
15	eL	12 38					
	F	13 21					id.
17	eL	20 58					
	F	21 16					
17	eL	22 12					
	F	52					
18	iP	8 45 31					Cte E- $\Delta=2430$ Km.
	iS	49 30					Ile de Rhodes,
	L	54					L faibles
	F	9 26					
19	eP	7 28 (37)					$\Delta=(440$ Km.)
	S	29 25					région. Val Godemar
	L	29 46					(d'après Strash)

Mars 1935

Dates.	Phases.	T. H. Gr.	T _H	T _L	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	g	g	
19	M	7 30-31	7	8	18	13	
	F	39					
20	traces	9 3-28					V. Galitzine.
20/21	e	23 19					
	L	0 5					
	M ₁	7-8		26		12	
	M ₂	9	21	23	7	11	
	F	1 49					
24	traces	15 21-36					V. Galitzine
27	eL	20 14					id.
	F	31					
29	e(P)	12 45 5					
	L	13 51					
	M ₁	54-55		22		13	
	M ₂	55-56	21		9		
	M ₃	14 4-5		18		8	
	F	15,3					
30	traces	3h37à4h19					V. Galitzine
30	i	16 53 14					id.
	F	56					
30	eP	21 33					
	L	22 5					
	M ₁	11-12		20		11	
	M ₂	15	16	19	10	10	
	F	23 13					
31	eP	3 24 55					Δ=(2770Km.)
	e(S)	29 21					
	(SR)	30 14					
	L	31					
	M ₁	32	8	16	16	19	
	M ₂	33	13	15	12	16	
	F	4 8					

JOURNAL SEISMOLOGIQUE.

1er: 2 toute la journée; 2: 2 jusqu'à 22h, 1 ensuite;
 3-10: 1 toute la journée.
 11: 1 jusqu'à 12h, 2 ensuite; 12: 2 jusqu'à 10h, 1
 ensuite; 13-16: 1 toute la journée; 17: 1 jusqu'à 7h, 2 de 7h à
 12h, 1 ensuite; 18: 1 jusqu'à 16h, 2 de 16h à 22h, 1 ensuite;
 19-20: 1 toute la journée.
 21: 1 jusqu'à 14h, 2 de 14h à 19h, 1 ensuite; 22: 1
 jusqu'à 7h, 2 de 7h à 20h, 1 ensuite; 23: 1 jusqu'à 6h, 2 de 6h
 à 11h, 1 ensuite; 24-25: 1 toute la journée; 26: 1 jusqu'à 7h, 2
 de 7h à 18h, 1 ensuite; 27-28: 1 toute la journée; 29: 1 jusqu'à
 3h, 2 de 3h à 11h, 1 ensuite; 30-31: 1 toute la journée.
 Caractéristique moyenne du mois: 1, 16.

° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 °



INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'UNIVERSITE DE PARIS

Directeur: Ch.Maurain.

Station séismologique:

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long.2°29'37"E Gr. Lat.48°48'34"N. Alt.47m.

Appareil:Séismographe Wiechert masse 1000 Kilogrs

Cte N: $T_0=11,5; \xi=4,2; V=216$. CteE: $T_0=11,7; \xi=4,0; V=228$

Bulletin séismique du 1er au 30 Avril 1935
par C.E.Brazier et L.Genau.

Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques
		h m s	s	s	μ	μ	
1er	eL	3 47					V.Galitzine.
	F	4 43					
2	traces	19h24à20h36					id.
3	eP	11 20 35					Δ=(5165Km.)
	PR	22 32					
	(S)	27 29		6		5	
	L	31					
	M	32-33	6	13	4	3	
	F	13 41					V.Galitzine.
3	traces	16h52à17h01					id
3	e	21 12					
	L	22 20					
	F	23,2					faible V.Gal.
4	eL	1 20					
	F	37					
4	eL	11 16					
	F	45					V.Galitzine.
5	eL	4 14					
	F	56					
5	eL	9 40					
	M	44	12	8	2	2	
	F	10,1					V.Galitzine.
5	traces	18h48à19h0					id.
10	eL	0 4					
	F	0,7					
11	eL	2 10					
	F	48					
11	P	23 22 12					Δ=4140Km.
11	PR ₁	23 39					dégâts province
12	eS	28 7					de Magadéran.Sud de
	L	31					la Mer Caspienne.
	M ₁	42	11	14	9	14	
	M ₂	46-47	13	13	15	26	
	F	2,6					
12	e	12 7					
	L	13 1					
	M	15-16		10		2	
	F	33					
12	eL	23 57					
	F	23 13					
14	traces	6h04à6h17					V.Galitzine.
15	id	31h53à22h10					id.
18	eL	22 38					
	F	45					



		Avril 1935						Remarques.	
Dates	Phases	T. M. Gr.			T _N	T _E	AN	A _E	
		h	m	s					
19	iP	15	27	57	8	7	120	105	Δ=2165Km.dilatation N-S:iP-12mm1 E-W:iP+10mm4 Méditerranée Orientale Côtes de Tripolitaine
	iS		31	35	9	11	230	210	
	L		33						
	M ₁		34-35		22	18	740	570	
	M ₂		37-38		15	14	380	380	
	M ₃		38-39		16	17	340	600	
	F	dans le suiv ^t							
19	iP	18	2	22					Δ=2190Km.réplique
	eS		6	3		6		10	
	L		8						
	M ₁		8-9			24		16	
	M ₂		9-10			22		13	
	M ₃		11		20	19	6	8	
	F	19,6							
19	eP	20	36	14					Δ=2160Km.réplique
	iS		39	51	10	8	13	20	
	L		41						
	M ₁		42-43		32	24	50	39	
	M ₂		43-44		23	22	24	39	
	F	22,4							
20	iP	5	15	29					Δ=2360Km.
	iS		19	23	9	7	25	51	
	L		21						
	M ₁		22-23		24	21	86	105	
	M ₂		25-26		15	15	38	69	
	M ₃		27		10	14	40	57	
	F	7,6							
20	eL	8	13						V.Galitzine.
	F		45						
20	traces	12	11-34						id.
20	id.	21	4-39						id.
20/ 21	eP _V	22	14	54					Δ=(9440Km.) destructeur dans l'Ile Formose.
	e(S) _L		25 (26)						
	L		46						
	M ₁		49-50		28		140		
	M ₂		50-51		18	26	80	80	
	M ₃		51-52		14	21	60	60	
	M ₄		53		12	13	41	43	
	F	1,3							
	eL	8	24						
	F	9	17						
21	traces	20	8-17					V.Galitzine.	
22	e	13	35						Δ=(8000Km).
	L		46						
	F	14	43						
	eP	16	57	5					
23	e(S)	17	6	25					
	L		26						
	M		33-34			11		1	
	F	16	4						
	traces	9h54	à 10h12						
24	iP	16	4	22					V.Galitzine. Δ=(8870Km)
	e(S)		14	26					
24	L		34						Δ=(9090Km)
	M		50-51			12		2	
	F	17,6							
	eP	19	4	4					
	e(S)		14	19					
	L		34						
	M		38-39			22		5	
25	F	20,6							V.Galitzine.
	traces	1	28-40						

Avril 1935

3/

Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
26	traces	8 26-37					V. Galitzine.
27	eP	19 9 23					Δ = 2590 Km.
	eS	13 36					
	L	15					
	M	17-18		15		2	
	F	19 54					
29	e	19 31 50					
	L	40					
	F	53					
29	traces	20h54 à 21h09					V. Galitzine.

JOURNAL SEISMOLOGIQUE

1er-9: 1 toute la journée; 10: 1 jusqu'à 2h, 2 ensuite;
 11: 2 jusqu'à 16h, 1 ensuite; 12-20: 1 toute la journée
 21-24: 1 toute la journée; 25: 1 jusqu'à 10h, 0 ensuite;
 26: 0 jusqu'à 7h, 1 ensuite; 27: 1 jusqu'à 10h, 0 ensuite; 28: 0
 jusqu'à 12h, 1 ensuite; 29-30: 1 toute la journée.
 Caractéristique moyenne du mois: 0,99.

././././././././.

Station sismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR


Long. 2°29'37"E Gr. Lat. 48°48'34"N. Alt. 47m.

Appareil: Séismographe Wiechert masse 1000 Kilogrs.

Cte N: T₀=11^s7; ε=4.6; V=220. Cte E: T₀=11^s8; ε=4.3; V=230Bulletin sismique du 1^{er} au 31 Mai 1935

par C-E. Brazier et L. Gonaux.

Dates.	Phases.	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	p	p	
1 ^{er}	eL	4 42					faible V. Gal.
	F	54					
1 ^{er}	traces	9h51a10h0					V. Galitzine.
1 ^{er}	e	10 31					
	L	36					
	M ₁	45-46	12	12	8	14	
	M ₂	48	10	12	7	12	
	F	12 35					
2	traces	8 27-42					V. Galitzine.
2	id.	10 36-49					id.
2	id.	20 37-48					id.
3	id.	5 22-54					id.
4	eL	23 50					
	M	59-60	17	14	2	3	
	F	0 31					
5	traces	3 45-52					V. Galitzine.
5	id.	19 11-38					id.
6	id.	0 16-34					id.
6	eL	18 36					
	F	52					
6	traces	20 20-32					V. Galitzine.
7	e	6 14					
	L	32					
	M ₁	56-57	26	25	5	7	
	M ₂	7 2-3	24	26	5	8	
	F	8, 5					
7	traces	10h52a11h6					V. Galitzine.
9	eL	5 41					
	F	52					
10	traces	17h50a18h26					V. Galitzine.
11	id.	19 23-59					id.
12	eL	0 47					faible V. Gal.
	F	1 16					
12	e	5 33					id.
	L	49					
	F	6 18					
12	e	20 26					
	L	21 2					
	M ₁	4-5	20		3		
	M ₂	6-7		19		4	
	F	22 16					
13	eL	20 24					
	M ₁	43-44	19	21	4	6	
	M ₂	45-46	15	13	3	4	
	F	22, 0					



Mai 1935									
Dates.	Phases.	T.	M.	Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h	m	s	s	s	μ	μ	
14	e(P)	23	38						
	PR		41	55					
	e		48	38					
	L		57						
	M ₁	0	16-17		39	26	48	19	
	M ₂		22-23		25		27		
	M ₃		23-24		21	18	18	8	
	F ^s	d ^s	le suiv ^t						
15	e ₁	2	10	49					
	e ₂		18	31					
	L		32						
	M ₁		39-40		13	13	2	5	
	M ₂		40-41			13		4	
	F ²	3	43						
16	e	17	45						
	L		55						
	M		56-57			11		2	
	F	18,6							
16	iP	21	1	12					
	P'		1	32					
	L		53						
	M	22	19-20			18		2	
	F	22,7							
18	traces	22h56a18h9							V.Galitzine
18	P	21	51	27					id.
	L	22	51						
	F	23	36						
20	e	5	40						
	L	6	20						
	M ₁		25-26			22		6	
	M ₂		32		20	18	3	4	
	F ²	7,2							faible.V.Gal.
20	eL	18	31						
	F	19,0							
21	e	4	33						
	L	5	2						
	F	5,4							
21	e(P)	7	12	45					
	L		45						
	M ₁	8	5-6			21		5	
	M ₂		6-7		23	24	5	5	
	M ₃		9-10		22	20	5	4	
	F	9,4							faible.V.Gal.
21	e	12	56						
	L	14	7						
	F	15,0							
22	eL	8	59						
	M	9	2-3		8	10	2	1	
	F	9	12						
22	eL	10	29						
	F		41						
23	e ₁	18	7	21					
	e ₂		13	57					
	L		18						
	M ₁		22-23		18	18	3	5	
	M ₂		25-26		10	22	1	5	
	F ²	19,0							
24	traces	3h55a4h3							V.Galitzine.
24	eP	5	50	26					Δ=(10040Km)
	PR		54	43					
	e(S)	6	1	(26)					
	L		26						

Dates.	Phases.	T. M ^o Gr.			T _H	T _L	Mai 1935		Remarques.
		h	m	s			AN	A _L	
24	M ₁	6	29-30		30		27		
	M ₂		33-34		19	24	15	29	
	M ₃		40-41			18		21	
	F	9,4							
24	traces	23	36-54						V. Galitzine.
25	e ₁	0	25						
	e ₂		34						
	L	1	3						
	M ₁		4-5		21		3		
	M ₂		8-9			18		4	
	M ₃		12-13			21		7	
	F	2,5							
25	eL	9	33						faible V. Gal.
	F		59						
25	traces	22	25-37						id.
26	e ₁	22	21	59					
	e ₂		30	55					
	L		59						
	M ₁		59-60		18	18	3	4	
	M ₂	23	7		18	18	4	4	
	F	0	48						
27	e	3	31						
	L	4	36						
	M		41-42			19		3	
	F	6,7							
28	iP	17	11	53					
	L		48						
	F	18	23						
29	eL	20	31						
	F	21	11						
30	iP	21	42	2					Δ = 5480 Km.
	eS		49	13					Destruction Bélout-
	(PS)		49	51					chistan.
	L		58						
	M ₁	22	5-6		19		820		
	M ₂		8-9		16	16	330	430	
	M ₃		10		13	16	410	430	
	M ₄		11-12			12		340	
	M ₅		13-14		12		260		
	F	3,2							
31	eL	9	6						V. Galitzine.
	F		35						id.
31	eL	13	38						
	F		57						id.
31	eL	17	45						
	F	13	3						

Journal séismologique.

1er au 5: 1 toute la journée; 6: 1 jusqu'à 10h, 0 ensuite;
 7, 0 jusqu'à 8h, 1 ensuite; 8-10: 1 toute la journée.
 10-31: 1 toute la journée.
 Caractéristique moyenne du mois: 0,97.

==+==+==+==+==+==+==+==+==

Station sismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. 2°29'37"E Gr. Lat. 48°48'34"N. Alt. 47m.

Appareil: Séismographe Wiechert massel 000 kilogrs.

Cte N: T₀=11^s9; ξ =4,2; V=219. Cte E: T₀=11^s9; ξ =3,8; V=231.Bulletin sismique du 1^{er} au 30 Juin 1935
par C-E. Brazier et L. Genaux.

Dates.	Phases.	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _L	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
1 ^{er}	e	4 51					
	L	5 01					
	M	9-10	10	12	1	1	
	F	32					
2	iP	9 25 35					compression.
	e	33 02					
	L	36					
	M ₁	51-52	13	12	3	3	
	M ₂	53-54		15		7	
	M ₃	55-56	12	12	2	5	
	F	10 41					
5	eP	11 51 (25)					$\Delta=550\text{km?}$
	e(S)	52 (28)					
	L	53					
	M	53-54	8	9	3	2	
	F	57					
8	eL	1 30					V. Galitzine.
	F	53					
9	eL	7 34					id. faible
	F	57					
10	traces	7 40-55					id.
11	e	22 18					id.
	L	36					
	F	23 10					
12	traces	13 33-58					id.
14	id.	21h48 à 22h12					id.
16	eL	7 27					id. faible
	F	8 03					
18	traces	18h44 à 19h08					id.
18	e	22 48					
	L	23 23					
	M	35-36		14		2	
	F	0 50					
19	e	22 34					
	L	23 27					
	M	32-33		20		3	
	F	0 43					
22	e ₁	16 06 44					
	e ₂	17					
	L	50					
	M ₁	57-58	19		4		
	M ₂	17 0-1		20		4	
	F	18 12					
23	traces	7 43-58					V. Galitzine.

Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long.2°29'37''E Gr. Lat.48°48'34''N. Alt.47m.

Appareil:Séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N:T°=12s0;ξ=4s1;V=222. Cte E:T°=12s2;ξ=3,8;V=231

Bulletin séismique du 1er au 31 Juillet 1935
par C.-E.Brazier et L.Genaux.

Dates	Phases	T. M. G.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques,
		h m s	s	s	μ	μ	
2	eL	15 51					V. Galitzine, faible
	F	16 08					id.
3	traces	22h58à23h09					Δ=(5160 km)
5	iP	18 01 33					
	PR	03 48					
	(S)	08 24					
	(SR)	12 07					
	M ₁	22-23	19		13		
	M ₂	26	16	12	13	12	
	F	19 59					V. Galitzine
6	eL	4 12					id
	F	25					id
6	traces	5h50à6h04					
6	eL	22 56					
	F	23 19					Δ=(9480 km)
7	eP _V	13 36 32					
	PR	39 15					
	(S)	47 06					
	L	14 11					
	M ₁	14-15	20	20	5	4	
	M ₂	23-24		13		4	
	M ₃	26-27	17		7		
	F ₃	16,1					V. Galitzine
8	eL	13 51					id, faible
	F	14 24					
8	eL	17 47					id
	F	18 22					id
9	traces	1h43à2h01					
9	eL	3 9					id
	F	28					
9	eL	5 40					
	F	6 07					
9	eL	7 23					
	F	8 31					
9	e	12 (36)					
	L	13 10					
	M	22-23	18	19	3	5	
	F	15 54					V. Galitzine
9	traces	18h53à19h11					id
9	eL	22 13					
	F	43					

Dates	Phases	T. M. G.			T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques
		h	m	s	s	s	μ	μ	
10	traces	8	03	53					V. Galitzine
10	id	21	09	48					
11	e(P)	8	37	44					
	L	9	12						
	M ₁		14-15		17	18	2	3	
	M ₂		16-17		15	18	2	3	
	F	9	57						
11	eP	13	27	41					V. Galitzine
	P'			48					
	L	14	25						
	F	15	32						
12	e	2	06						
	L		13						
	M		14-15		6	6	4	2	
	F		39						
12	eL	21	42						id
	F	22	02						
13	e	0	10	45					id
	F		24						
13	traces	1	31-43						id
14	id	14h48	à 15h07						id
15	eL	18	41						
	F	19	03						
16	iP	16	31	54					Δ=9740 km.
	PR		35	24					
	eS		42	40					
	L	17	05						
	M ₁		8-9		21		16		
	M ₂		15-16		14	13	15	17	
	F ²		18,6						
16	traces	20h28	à 21h17						V. Galitzine
17	e	0	18						id
	L	1	12						
	F	2,3							
17	e ₁	4	40	58					
	e ₂		48	21					
	L		56						
	M ₁	5	0-1			16		7	
	M ₂		1-2		17	16	4	4	
	M ₃		4-5		14	13	3	5	
	F	6	10						
17	eP	11	00	47					
	PR		05	10					
	e		14	57					
	L		39						
	M ₁		46-47		20		11		
	M ₂		50		19	17	9	3	
	F ²	13,8							
19	PV	1	02	35					Δ=9590 km.
	PV		02	41					
	PR		06	03					
	iS _c P _c S		13	03					
	S		13	13					
	L		34						
	M ₁		37-38			26		40	
	M ₂		41-42			21		36	
	M ₃		46		16		27		
	M ₄		49		16	17	27	32	
	F ⁴	4,0							
21	eL	16	53						V. Galitzine
	F	17	10						

Juillet 1935

International
Seismological
Centre

Dates	Phases	T. M. G.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques
		h m s	s	s	μ	μ	
23	eL	4 34					V. Galitzine, faible
	F	5 10					
24	traces	4h49 à 5h31					id
26	traces	3 5-18					id
26	e(P)	4 55 41					Δ = (8840 km)
	e(S)	5 05 43					
	L	22					
	M	28-29		13		1	
	F	6 14					
26	P	8 14 51					Δ = (8150 km)
	(PR)	16 36					
	(S)	24 18					
	:L	37					Lfaibles, non mesurables
	F	9,3					
26	eL	9 48					
	F	10 16					
26	e	11 (1)					
	L	8					
	M ₁	11-12	26		28		
	M ₂	16	19	13	9	7	
	F ₂	11,33					
28	e	5 32 43					V. Galitzine
	L	55					
	F	6,3					
28	traces	19 07-16					id
29	e(P)	4 39 42					id
	L	5 10					
	F	38					
29	iP	7 57 49					dilatation
	i	59 46					Δ = 12500 Km ca.
	(PR)	8 J 42					
	(S)	11 11					
	(PS)	12 03					
	L	21					
	M ₁	25-26	36		57		
	M ₂	30	30	27	38	20	
	M ₃	31-32	22	21	44	16	
	F ₃	11 20					
29	e	23 (33)					
	L	45					
	M	50	7	7	2	2	
	F	0 32					
30	traces	3 30-42					V. Galitzine
30	e	6 46 33					
	L	50					
	M	7 0-1		17		3	
	F	7,6					
30	e	12 43					
	L	50					
	F	13 25					
31	e	10 14					
	L	26					
	M	32-33		15		1	
	F	11,0					

Journal séismologique .

1er-5:1 toute la journée; 6:1 jusqu'à 6h,0 ensuite; 7-8:0 toute la journée; 9:0 jusqu'à 19h,1 ensuite; 10:1 toute la journée; 11-17:1 toute la journée; 18:1 jusqu'à 10h,0 ensuite; 19:0 jusqu'à 12h,1 ensuite; 20:1 toute la journée; 21-31:1 toute la journée.
Caractéristique moyenne du mois: 0,85 .

Directeur: Ch.Maurain.

Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. $2^{\circ}29'37''$ E. Gr. Lat. $48^{\circ}48'34''$ N. Alt. 47m.

Appareil: séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N: $T^{\circ}=12s1; \xi=4,1; V=221$. Cte E: $T^{\circ}=12s2; \xi=3,8; V=233$.

Bulletin séismique du 1er au 31 Août 1935

par C.-E. Brazier et L. Genaux.

Dates	Phases	T. M. G.	T_N	T_E	A_N	A_E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
1er	eP	14 20 24					
	(PR)	24 41					
	L	34					
	M ₁	15 3-4	17		5		
	M ₂	9-10		19		6	
	F ₂	15,5					
1er	e(P)	16 20 35					
	L	47					
	M	52-53		19		6	
	F	18,7					
2	traces	1110-29					V. Galitzine
3	iP	1 23 1					$\Delta = 9380$ Km
	iS	33 29					Côte Sumatra (Strasbg)
	L	49					
	M ₁	2. 5-6	17	19	28	90	
	M ₂	7-8		15		40	
	M ₃	9-10	18		40		
	F	5,4					
3	e	5 36 56					
	F	6,1					
3	eL	12 45					
	F	13,0					
3	eL	13 57					
	F	14,3					
4	eL	3 20					V. Galitzine
	F	3,7					
4	traces	1019-25					V. Galitzine
4	traces	1840-46					V. Galitzine
5	eL	15 9					Faible V. Gal.
	F	25					
6	eL	0 42					
	F	1,8					
6	eL	14 25					Faible V. Galit.
	F	14,9					
6	eL	17 51					Faible V. Galit.
	F	18,3					
7	eL	9 43					Faible V. Galit.
	F	10,3					
10	e(P)	18 1 39					
	L	30					
	F	19,2					
11	eL	8 (24)					V. Galitzine
	F	32					

406 1935

International
Seismological
Centre

Dates	Phases	T. M. G.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	r	r	
11	cL	20 (37)					Faible V.Galit.
	F	20,9					
14	iP	14 45 49					
	e	47 56					
	F	57					
17	iP	2 4 21					$\Delta = (13000K)$
	e	7 37					
	(PS)	18 (37)					
	L	35					
	M ₁	3 1-2	33		50		
	M ₂	3-4		22		22	
	M ₃	7-8	24		38		
	M ₄	14-15		25		40	
	F	7,0					
17	eL	21 22					V.Galitzine
	F	21,7					
18	e	8 52					Faible V.Galit.
	L	9 53					
	F	11,7					
19	e(P)	18 32 7					
	F	36					
20	e ₁	8 58 (51)					
	e ₂	9 2 55					
	L	10					
	M	11-12	12	8	1	1	
	F	9,5					
21	iP	14 8 19					
	e	11 44					
	F	16,1					
22	c(P)	20 42					
	e	52 19					
	L	55					
	M ₁	55-56	14		3		
	M ₂	56-57		13		3	
	F	21,2					
23	eL	14 58					
	M	15 9	11	15	2	3	
	F	15,7					
25	e ₁	5 14 16					
	e ₂	19 1					
	L	22					
	M ₁	22-23		10		3	
	M ₂	25-26	14		3		
	M ₃	26-27	12		4		
	F	6,1					
26	traces	1341-47					V.Galitzine
26	cL	17 25					
	F	17,7					V.Galitzine
27	eL	6 16					V.Galitzine
	F	26					V.Galitzine
27	eL	15 24					V.Galitzine
	F	15,6					V.Galitzine
29	eL	11 25					V.Galitzine
	F	11,7					V.Galitzine
31	eL	1 12					V.Galitzine
	F	43					V.Galitzine
31	traces	1359 à 14h13					V.Galitzine

Dates	Phases	T. M. G.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	"	"	
31	iP	17 52 23					Δ =(9440Km)
	e(S)	18 2 55					
	L	14					
	H ₁	34-35	17	19	2	4	
	H ₂	35-36	17	16	2	3	
	F	19 40					

JOURNAL SEISMOLOGIQUE.

1er-6:0 toute la journée;7:0 jusqu'à 6h,1 de 6h à 21h,0 ensuite;
8:0 jusqu'à 3h,1 ensuite;9:1 toute la journée;10:1 jusqu'à 20h,
0 ensuite.

11:0 jusqu'à 18h,1 de 18h à 20h,0 ensuite;12:0 jusqu'à 7h,1 de
7h à 13h,0 ensuite;13:0 jusqu'à 6h,1 de 6h à 19h,0 ensuite;14:
0 jusqu'à 6h,1 ensuite;15:1 jusqu'à 14h,0 ensuite;16:0 jusqu'à 6h,
1 de 6h à 11h,0 ensuite;17-20:0 toute la journée.

21:0 toute la journée;22:0 jusqu'à 6h,1 ensuite;23:1 jusqu'à
3h,2 de 3h à 20h,1 ensuite;24-31:1 toute la journée.

Caractéristique moyenne du mois:0,52.

././././././././././././././././

Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. $2^{\circ}29'37''$ E.Gr. Lat. $48^{\circ}48'34''$ N. Alt. 47m.

Appareil: séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N: $T_0=11^s9$; $\xi=4,1$; $V=219$: Cte E: $T_0=12^s1$; $\xi=3,8$; $V=234$.

Bulletin séismique du 1er au 30 Septembre 1935

par C.-L. Brazier et L. Genaux

Dates	Phases	T. M. Gr.	T_N	T_E	A_N	A_E	Remarques.
		h m s	s	s	"	"	
1er	eL	1 27					V. Galitzine
	F	50					
2	e	7 47					
	L	8 26					
	F	9 38					
3	eL	11 48					
	M ₁	55-56		15		2	
	M ₂	57-58		13		1	
	F	12 22					
3	iP	17 39 22					$\Delta = 1840$ Kms
	iS	42 31					
	L	45					
	M ₁	46-47	12	11	2	2	
	M ₂	49-50	12	8	2	2	
	F	59					
4	iP	1 50 45					$\Delta = 9320$ Kms
	PR ₁	54 25					
	iS	2 1 11					
	L	24					
	M ₁	25-26	26		59		
	M ₂	26-27		28		51	
	M ₃	29-30	21	19	59	36	
	M ₄	34-35		17		41	
	M ₅	37-38	15	15	26	31	
	V ₂	4 15					
	F	5, 5					
6	eL	22 7					V. Galitzine
	F	16					
7	eL	18 53					
	F	57					
9	e ₁	6 37 19					
	e ₂	47 4					
	L	7 9					
	M ₁	18-19		22		35	
	M ₂	29-30	20		31		
	F	9, 4					



Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	°	°	
11	eL	13 14					
	F	55					
11	iP	14 16 24					Δ = 9085Kms
	PR	20 33					
	iS	26 38					
	L	42					
	M ₁	50-51		24		202	
	M ₂	55-56	23		155		
	M ₃	57-58	20	20	235	202	
	M ₄	15 0-1	17	16	132	85	
	M ₅	14-15	20	13	34	15	
	W ₂	16 27					
	F	18 25					
12	i	16 20 15					
	F	28					
14	traces	2130-37					V.Galt.Forte agitation
15	eL	12 20					
	M ₁	33-34	20		6		
	M ₂	35-36		18		8	
	F	13 30					
15	eL	14 46					
	F	16 52					
18	traces	5 33 à 6h4					V.Galitzine
18	e	8 35 15					Changement des feuilles
	L	9 7					
	M	13-14		19		4	
	F	50					
18	eL	20 59					
	F	21 10					
19	eL	2 59					
	F	ds 1e svt					
19	e	3 20 35					
	L	35					
	M ₁	45-46	19	11	6	2	
	M ₂	46-47		20		13	
	F	4 35					
20	e	2 2 28					
	i	5 53					
	i(PR)	7 25					
	e(S)	15 33					
	L	39					
	M ₁	50-51	27	27	347	380	
	M ₂	3 3-4	19	20	359	365	
	M ₃	9	18		160		
	M ₄	9-10		14		40	
	F	ds 1e svt					
20	i	5 43 47					
	e(S)	53 48					
	L	6 22					
	M ₁	25-26		30		56	
	M ₂	29-30	24		32		
	M ₃	36-37	21		51		
	M ₄	49		17		20	
	F	8,9					
20	(e)	21 24 51					
	L	22 9					
	F	23 15					
22	traces	2 7-11					V.Galitzine

Septembre 1935


Dates	Phases	T. H. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	°	°	
23	e ₁	9 33 56					Changement des feuilles
	e ₂	37 16					
	e ₃	39 1					
	e ₄	41 34					
	L	10 8					
	M ₁	21-22	27	31	15	38	
	M ₂	40-41	19		11		
	M ₃	43-44		17		6	
	M ₄	1124-25	19		6		
	M ₅	26-27		19		7	
	F	12 35					
24	e	5 21 45					
	L	6 9					
	F	7,4					
24	traces	9 8-35					V.Galitzine
24	traces	17 30 à 18h3					V.Galitzine
24/25	e ₁	22 23 34					
	e ₂	28 23					
	e ₃	33 30					
	e ₄	42					
	L	49					
	M ₁	55-56	20	16	11	9	
	M ₂	57	16	12	10	4	
	M ₃	23 0-1	16	12	8	6	
	F	0 30					
25	traces	0 45 à 1h18					V.Galitzine
25	i	10 40 20					
	e	52 35					
	L	11 22					
	M ₁	33-34	23	18	6	6	
	M ₂	34-35	18		5		
	M ₃	35-36		18		5	
	F	13,0					
25	traces	13 44 à 14h3					V.Galitzine
26	traces	3 32-48					V.Galitzine
26/27	eL	23 43					V.Galitzine
	F	0 29					
28	cP	16 19 (8)					eP dans l'int.de min.
	i (PR)	19 31					Δ = 350kms environ.
	iS	19 49					Ressenti dans la région
	(L)	19 53					de Limoges, d'après la
	F	25					Presse.
29	traces	7 7-13					V.Galitzine
29	traces	13 18-22					V.Galitzine
30	traces	0 57 à 1h11					V.Galitzine
30	e ₁	19 7 41					
	e ₂	13 23					
	e ₃	16 1					
	L	19					
	F	50					

JOURNAL SEISMOLOGIQUE.

1er:1 toute la journée;2:1 jusqu'à 8h,0 ensuite;3:0 jusqu'à 13h,1 de 13h à 19h,0 ensuite;4-5:0 toute la journée;6-9:1 toute la journée;10:1 jusqu'à 7h,2 ensuite;11:2 jusqu'à 12h,1 ensuite;12:1 toute la journée;13:1 jusqu'à 7h,2 ensuite;14:2 toute la journée;15-16:1 toute la journée;17:2 jusqu'à 22h,1 ensuite;18:1 toute la journée;19:1 jusqu'à 4h,2 de 4h à 16h,3 de 16h à 21h,2 ensuite;20:2 jusqu'à 19h,1 ensuite;21:1 toute la journée;22:0 jusqu'à 14h,1 ensuite;23-30:1 toute la journée

Caractéristique moyenne du mois,1,05.

././././././././././././././././.



Station séismologique

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. 2°29'37"E.Gr. Lat. 48°48'34"N. Alt.47m

Appareil: séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N: $T_0=11^s8$; $\xi=3,6$; $V=219$. Cte E: $T_0=11^s9$; $\xi=3,4$; $V=233$.

Bulletin séismique du 1er au 31 Octobre 1935

par C.E.Brazier et L.Genau.

Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	m	m	
1er	traces	0h56à 1h5					V.Galitzine.
1er	traces	5h53à 6h0					V.Galitzine.
1er	e	11 39 32					
	eL	47					
	F	55					
2	iP	5 45 21					$\Delta=9020$ km.
	PR ₁	48 30					Compression; N-, E-.
	iS	55 33					
	eL	6 12					
	M ₁	25-26	21		23		
	M ₂	26-27		20		17	
	M ₃	29-30		15		8	
	F	8,0					
4	traces	15h24à 15h35					V.Galitzine.
4	traces	23h19à 23h30					V.Galitzine.
6	e	4 55 56					V.Galitzine.
	eL	5 0					
	F	36					
6	eL	6 1					V.Galitzine.
	F	59					
6	e(L)	15 21					V.Galitzine.
	F	35					V.Galitzine.
7	e	5 22					
	eL	39					
	F	6 21					
8	e ₁ (P?)	9 30 1					
	e ₂ (S?)	37 17					
	e ₃	38 31					(SR?)
	e ₄	40 56					
	L	43					
	M ₁	51-52		10		6	
	M ₂	54-55		12		5	
	F	11,0					
9	iP	22 13 17					$\Delta=2270$ km.
	PR ₁	13 45					Dilatation; N+, E+.
	iS	17 3					
	SR ₁	17 31					
	L	18					
	M ₁	20-21		13		21	
	M ₂	22-23	10		17		
	M ₃	23-24	10	8	17	18	
	F	23 24					

Octobre 1935.



Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
10	traces	21 6 à 21h20					V. Galitzine.
11/12	eP	22 36 44					
	e ₁	40 30					
	e ₂	46 37					
	e ₃	53 56					
	e ₄	58 (14)					inter. minute.
	eL	23 12					
	M	20-21		24		18	
	F	1, 5					
12	P	16 58 58					Δ = 9230 km.
	PR ₁	17 1 20					Dilatation.
	PR ₂	3 44					
	S	8 20					
	SR ₁	14 7					
	SR ₂	17 (14)					inter. minute.
	(SR ₃)	20 44					
	L	22					
	M ₁	34-35	18	21	45	138	
	M ₂	39-40	19	19	87	115	
	M ₃	42-43	17		48		
	(W ₂)	18 49					
	F	20, 0					
13	e(P)	2 10 3					Δ = (9440) km.
	e(S)	20 35					
	eL	43					
	F	3 52					
13	eL	19 49					
	F	20 6					
14	eL	10 40					
	F	53					
14	traces	20h51 à 20h57					V. Galitzine.
15	traces	21h0 à 21h23					V. Galitzine.
17	eL	15 31					
	F	16, 0					
18	P	0 24 33					Δ = 9280 km.
	PR ₁	27 49					Compression.
	e	31 29					
	S	34 57					
	SR ₁	40 44					
	SR ₂	45 28					
	(SR ₃)	47 8					
	L	51					
	M ₁	1 0-1	19		67		
	M ₂	1-2		21		114	
	M ₃	8-9	16	16	58	42	
	M ₄	10-11	15	15	40	36	
	F ⁴	4, 5					
18	traces	6h44 à 7h10					V. Galitzine.
18	e	11 20 (11)					inter. minute.
	PR ₁	24 (20)					
	e(S)	33 50					
	(SR ₁)	39 41					
	L	59					
	M	12 12-13		20		24	
	F	14, 0					
18	e(P)	15 6 (30)					Δ = (9280) km.
	PR ₁	9 43					
	eS	16 54					
	e	29 37					



Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
18	eL	15 36					
	M ₁	42-43	21	19	13	19	
	M ₂	49-50	15		10		
	M ₃	53-54	13		8		
	F	17,0					
20	traces	10h38à10h55					V. Galitzine.
21	e ₁	11 12 28					
	e ₂	13 29					
	e ₃	15 3					
	F	21					
22	e ₁	7(38)					Début troublé par le
	e ₂	40 57					changement des feuilles
	F ₂	52					
25	eL	1 22					
	F	2 2					
25	traces	18h22à18h34					V. Galitzine.
26	traces	21h49à21h55					V. Galitzine.
27	eL	7 10					
	F	22					
31	eL	19 11					
	M ₁	18-19		15		6	
	M ₂	19-20	15		5		
	F ₂	50					

1er:1 jusqu'à 5h,2 de 5h à 13h,1 ensuite;2:1 jusqu'à 5h,2 ensuite;
3:2 toute la journée;4:2 jusqu'à 19h,1 ensuite;5-8:1 toute la journée;
9:1 jusqu'à 4h,2 de 4h à 13h,1 ensuite;10:1 jusqu'à 6h,2 de 6h à 23h,
1 ensuite.
11:1 jusqu'à 6h,2 de 6h à 11h,1 ensuite;12-17:1 toute la journée;
18:1 jusqu'à 16h,2 de 16h à 18h,3 ensuite;19:3 jusqu'à 20h,2 ensuite;
20:2 jusqu'à 19h,1 ensuite.
21-27:1 toute la journée;28:1 jusqu'à 7h,2 de 7h à 9h,1 de 9h à 15h,
2 de 15h à 19h,1 ensuite;29:1 jusqu'à 6h,2 de 6h à 9h,1 de 9h à 14h,
2 de 14h à 20h,1 ensuite;30:1 jusqu'à 5h,2 de 5h à 23h,1 ensuite;31:
1 jusqu'à 5h,2 de 5h à 19h,1 ensuite.

Caractéristique moyenne du mois, 1,30.

• / • / • / • / • / • / • / • / • / • /

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'UNIVERSITE DE PARIS

Directeur: Ch.Maurain



Station séismologique:

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. $2^{\circ}29'37''$ E.Gr. Lat. $48^{\circ}48'34''$ N. Alt. 47m

Appareil: séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N: $T_0=11^s6$; $\xi=3,3$; $V=217$. Cte E: $T_0=11^s9$; $\xi=3,0$; $V=227$.



Bulletin séismique du 1er au 30 Novembre 1935

par C.E.Brazier et L.Genaux.

Dates	Phases	T. M. Gr.	T_N	T_E	A_N	A_E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
1er	P	6 12 47					$\Delta = 5740$ km.
	cS	20 9					Epicentre au Canada;
	eSR ₁	23 48					dégâts dans les pro-
	eSR ₂	25 46					vinces de Québec et
	L	27					Ontario.
	M	34-35	13	13	9	8	
	F	7,5					
1er	e(P)	16 34 (26)					inter.minute.
	e(S)	44 26					$\Delta = (8800)$ km.
	eL	17 3					
	M ₁	10-11	18		30		
	M ₂	18-19		13		9	
	F	15,6					
5	traces	10 43-58					V.Galitzine.
5	e	21 25					
	eL	52					
	F	22,7					
7	e ₁	4 41 1					
	e ₂	43 43					
	e ₃	45 18					
	i	47 10					
	eL	48					
	M	50-51		7		6	
	F	5,0					
7	eL	21 27					V.Galitzine.
	F	21,7					
10	e(P)	18 38 43					
	e	47					
	eL	55					
	F	20,0					
11	eL	14 22					
	F	15,0					
12	traces	22 24-35					V.Galitzine.
14	cL	0 36					
	F	1,0					
14	e	20 18					
	eL	21 0					
	F	22,0					
16	e(P)	0 13 52					$\Delta = 6100$ km.?
	e(S)	21 33					
	eL	29					
	F	0,8					



Novembre 1935

Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _L	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
16	eL	6 44					
	F	7,2					
17	e	8 0(51)					
	eL	52					
	F	9,8					
18	traces	7 30-36					V.Galitzine.
23	(e)	8 6 3					
	e	16 5					
	eL	34					
	F	8,8					
25	P	10 15 47					Δ =9300 km.
	cS	26 12					
	eL	52					
	M	11 5-6		16		6	
	F	12,0					
28	eL	13 18					V.Galitzine.
		21					
28	eL	23 28					V.Galitzine.
	F	33					
30	e?	3 51 54					Forte agitation.
	e	4 1 31					
	eL	19					
	F	5,0					

JOURNAL SEISMOLOGIQUE

1er-2:1 toute la journée;3:1 jusqu'à 9h,2 ensuite;4:2 jusqu'à 18h,1 ensuite;5:1 toute la journée;6:1 jusqu'à 16h,2 de 16h à 20h, 1 ensuite;7-8:1 toute la journée;9:1 jusqu'à 13h,2 de 13h à 21h, 1 ensuite;10:1 toute la journée.

11:1 toute la journée;12:1 jusqu'à 16h,2 de 16h à 19h,1 ensuite; 13:1 jusqu'à 5h,2 de 5h à 20h,1 ensuite;14:1 jusqu'à 15h,2 de 15h à 20h,1 ensuite;15:1 jusqu'à 14h,2 de 14h à 19h,1 ensuite;16:1 jusqu'à 15h,2 de 15h à 18h,1 ensuite;17-18:1 toute la journée;19:1 jusqu'à 16h,2 de 16h à 20h,1 ensuite;20:1 jusqu'à 13h,2 ensuite.

21:2 jusqu'à 8h,1 ensuite;22-25:1 toute la journée;26:1 jusqu'à 6h,2 ensuite;27:2 jusqu'à 18h,1 ensuite;28:1 toute la journée;29: 1 jusqu'à 12h,2 ensuite;30:2 jusqu'à 1h,3 de 1h à 20h,2 ensuite.

Caractéristique moyenne du mois: 1,27.

././././././././././././././././.

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE L'UNIVERSITE DE PARIS

Directeur: Ch.Maurain



Station séismologique:

OBSERVATOIRE GEOPHYSIQUE DU PARC SAINT-MAUR

Long. 2°29'37"E.Gr. Lat. 48°48'34"N. Alt.47m

Appareil: séismographe Wiechert masse 1000 kilogrs.

Cte N: $T_0=11^s 6; \xi=3,4; V=220$. Cte E: $T_0=11^s 8; \xi=3,2; V=229$.




Bulletin séismique du 1er au 31 Décembre 1935

par C.E.Brazier et L.Genaux.

Dates	Phases	T. M. Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	Remarques.
		h m s	s	s	μ	μ	
2	eL	0 34					
	M	35-36	17	18	11	12	
	F	1 05					
2	eL	17 26					
	M	32-33	16	20	6	10	
	F	18 07					
5	iP	18 11 04					
	e	16 04					
	eL	56					
	M ₁	19 11-12	17		7	7	
	M ₂	25-26		21			
	F	20 08					faible, V.Galitzine
8	eL	23 19					
	F	23,9					
9	eL	8 46					
	M	9 15-16		20		9	
	F	49					
11	eL	9 39					
	M	42-43		13		3	
	F	10,2					$\Delta = 8380\text{km.}$
14	iP	1 42 50					
	PR	45 08					
	S	52 34		9		26	
	PS?	54 43					
	L	57					
	M ₁	59-60		25		37	
	M ₂	2 6-7	18		9		
	F	3,6					V.Galitzine
14	Traces	12h30 à 13h0					
14	i ₁	13 11 07					
	i ₂	13 40					
	L	37					
	F	14,8					$\Delta = 8980\text{km.}$
14	eP	23 17 42					
/	S	27 52					
15	PS	28 56					
	L	40					
	M ₁	48-49	24	24	41	180	
	M ₂	50	19	23	33	180	
	M ₃	53-54		17		95	
	M ₄	58-59	17		36		
	F	3,2					

Décembre 1935
Remarques.



International
Seismological
Centre

Dates Phases T. M. Gr.			T _N	T _E	A _N	A _E	
		h m s	s	s	μ	μ	
15	e(P)	7 27 09					lointain, phases douteuses
	(PR)	32 09					
	e	41 55					
	L	8 05					
	M ₁	8-9		44		250	
	M ₂	14	42	32	135	145	
	M ₃	18	28	30	140	200	
	M ₄	29-30	31		120		
	F ⁴	12,2					
16	eP	17 09 01					=8300km
	iS	18 41					
	L	34					
	F	18,1					
17	eL	14 28					V. Galitzine
	F	15 33					
17	eP	19 31 17					Δ = 9090km
	(PR)	34 38					
	eS	41 32					
	SR	48 06					
	L	58					
	M ₁	20 6-7	31	39	240	200	
	M ₂	7-8	23		160		
	M ₃	10-11	21	21	110	100	
	F ³	21,8					
17	eL	23 26					V. Galitzine
	F	0,2					
18	e	7 46					
	L	52					
	M ₁	52-53	26	22	30	12	
	M ₂	57-58	14	13	5	5	
	F ²	9,1					
19	L						Traces de L entre 10h-11h V. Galitzine id.
20	eL	0 33					
	F	2 13					
20	e ₁	18 59 05					
	e ₂	59 57					
	L	19 48					
	M ₁	20 2-3	17		11		
	M ₂	3-4		21		10	
	F	21,1					
21	eL	12 32					
	F	14 18					
23	eL	15 21					V. Galitzine
	F	16,2					
23	Traces	18 12-50					id.
24	e	12 37					
	L	47					
	M	13 5-6		21		9	
	F	14,6					id.
24	Traces	15h21 à 16h06					
26	eL	21 32					
	F	22 36					
28	eP	2 48 51					Δ = 10045km
	(PR)	52 45					
	iS	59 47	23		360		
	PS	3 01 16					
	(SR)	12 14	25		210		
	L	13					
	M ₁	21-22		36		410	
	M ₂	33-34	26	26	220	210	
	M ₃	36-37		27		230	
	M ₄	47-48	23		170		
	F	7,32					

					Décembre 1935				Remarques.
Dates	Phases	T.	M.	Gr.	T _N	T _E	A _N	A _E	
		h	m	s	s	s	μ	μ	
28	eL	19	36						
	F	20	05						
29	eL	4	35						faible, V. Galitzine
	F	5	10						
30	eL	0	20						
	M	51-52			20	19	6	8	
	F	1,2							
30	e	3	9	10					ressenti à Strasbourg
	F		13						
30	e(P)	3	37	28					id.-
	eL		38	10					
	M		39		0,7	0,7	13	16	
	F		44						
<u>18</u>	e(P)	17	11	18	-	-	-	-	-
	L		41						
	F	18,3							

JOURNAL SEISMOLOGIQUE

1er:3 jusqu'à 12h,2 ensuite;2:2 toute la journée;3,4:1 toute la journée;5:1 jusqu'à 10h,2 de 10h à 18h,1 ensuite;6:1 toute la journée;7:1 jusqu'à 1h,2 de 1h à 8h,1 de 8h à 16h,2 de 16h à 20h,1 ensuite;8:1 jusqu'à 11h,2 de 11h à 13h,1 ensuite;9:1 toute la journée;10:1 toute la journée;11:1 jusqu'à 12h,2 de 12h à 17h,1 ensuite;12-14:1 toute la journée;15:1 jusqu'à 14h,2 ensuite;16:2 toute la journée;17-19:1 toute la journée;20:1 jusqu'à 19h,2 ensuite.

21-23:1 toute la journée;24:1 jusqu'à 3h, 2 ensuite;25: 2 toute la journée;26:2 jusqu'à 14h,1 de 14h à 18h,2 ensuite;27:2 jusqu'à 12h,1 de 12h à 15h,2 de 15 à 19h,1 ensuite;28:1 toute la journée;29:1 jusqu'à 16h,2 ensuite;30-31:2 toute la journée.

Caractéristique moyenne du mois: 1,35.

././././././././././././././././.